

Hemangioendotelioma Retiforme: Um Achado Incidental

Retiform Hemangioendothelioma: An Incidental Finding

Joana Alegria, Sara Elisa Andrade, Gabriela de Araújo Oliveir¹,
Ana Luísa Rodrigues Pereira, Rita Chavães

Autor Correspondente/Corresponding Author:

Joana Silva Alegria [joanasalegria@gmail.com]

ORCID iD: <https://orcid.org/0009-0004-6557-3501>

USF MaxiSaúde, ACeS Cávado I, Braga, Portugal

DOI: <https://doi.org/10.29315/gm.860>

Rua Nossa Senhora do Sameiro, n.º 20, Fraião, 4715-348 Braga, Portugal

PALAVRAS-CHAVE: Hemangioendotelioma; Neoplasias da Pele

KEYWORDS: Hemangioendothelioma; Skin Neoplasms

Doente do sexo feminino, 45 anos, caucasiana, com antecedentes de hipertensão arterial, otosclerose esquerda, fibroadenomas mamários e patologia da coifa dos rotadores. Medicada com perindopril 5 mg. Sem hábitos tabágicos, alcoólicos ou consumo de drogas ilícitas.

Em consulta de vigilância com o Médico de Família, refere tumefação indolor na face externa do braço direito com cerca de 2 anos de evolução, sem outras queixas associadas. Ao exame objetivo apresentava uma lesão nodular eritematosa na face externa do braço direito com cerca de 1 cm (Fig. 1).

Foi referenciada para a Consulta de Pequena Cirurgia da USF para biópsia excisional da lesão. O resultado histopatológico revelou um hemangioendotelioma retiforme, com indicação para alargamento da margem profunda de exérese. Na Fig. 2, podem-se observar duas lâminas da histopatologia da lesão. Na Fig. 2A sa-



FIGURA 1. Fotografia da lesão nodular eritematosa no braço direito.

USF MaxiSaúde, ACeS Cávado I, Braga, Portugal

Recebido/Received: 2023-12-14. Aceite/Accepted: 2025-04-05. Publicado online/Published online: 0000-00-00. Publicado/Published: 0000-00-00

© Author(s) (or their employer(s)) and Gazeta Médica 2025. Re-use permitted under CC BY-NC 4.0. No commercial re-use.

© Autor (es) (ou seu (s) empregador (es)) e Gazeta Médica 2025. Reutilização permitida de acordo com CC BY-NC 4.0. Nenhuma reutilização comercial.




FIGURA 2. A) Lâmina corada por hematoxilina-eosina, ampliação 100x. B) Lâmina corada por hematoxilina-eosina, ampliação 400x.

lientam-se as estruturas vasculares irregulares e dispersas num padrão definido como "retiforme". Na Fig. 2B observam-se as células endoteliais, algumas projetando-se para o lúmen vascular, sendo que em torno dos vasos existe proliferação de células de tipo endotelial misturadas com colagénio. Após receção deste resultado, foi realizado o alargamento da margem cirúrgica, tendo o resultado histopatológico confirmado a ausência de estruturas neoplásicas.

O hemangioendotelioma retiforme é uma neoplasia vascular extremamente rara, de etiologia desconhecida, de difícil reconhecimento, pela sua apresentação inespecífica, e cujo diagnóstico diferencial engloba um amplo espectro de lesões que podem ser benignas ou malignas.¹ É mais prevalente no sexo feminino e afeta sobretudo jovens adultos. As lesões localizam-se, na maioria dos casos, nas extremidades, mais frequentemente nos membros inferiores. É um tumor indolente, com baixo risco de metastização, mas elevada taxa de recidiva local, pelo que o tratamento recomendado é a excisão com margens cirúrgicas livres.^{1,2} O diagnóstico é estabelecido através da análise histopatológica.³

DECLARAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO /CONTRIBUTORSHIP STATEMENT

JA; SEA; GAO; ALRP E RC: Elaboração, escrita do artigo
Todos os autores aprovaram a versão final a ser publicada.

JA; SEA; GAO; ALRP AND RC: Elaboration, writing of the article

All the authors approved the final version to published.

RESPONSABILIDADES ÉTICAS

CONFLITOS DE INTERESSE: Os autores declaram a inexistência de conflitos de interesse na realização do presente trabalho.

FONTES DE FINANCIAMENTO: Não existiram fontes externas de financiamento para a realização deste artigo.

CONFIDENCIALIDADE DOS DADOS: Os autores declaram ter seguido os protocolos da sua instituição acerca da publicação dos dados de doentes.

CONSENTIMENTO: Consentimento do doente para publicação obtido.

PROVENIÊNCIA E REVISÃO POR PARES: Não comissionado; revisão externa por pares.

ETHICAL DISCLOSURES

CONFLICTS OF INTEREST: The authors have no conflicts of interest to declare.

FINANCING SUPPORT: This work has not received any contribution, grant or scholarship.

CONFIDENTIALITY OF DATA: The authors declare that they have followed the protocols of their work center on the publication of patient data.

PATIENT CONSENT: Consent for publication was obtained.

PROVENANCE AND PEER REVIEW: Not commissioned; externally peer-reviewed.

REFERÊNCIAS

1. Mota A, Argenziano G, Zalaudek I, Piana S, Longo C, Moscarella E, et al. Clinical, dermoscopic and histopathologic findings of retiform hemangioendothelioma. *Dermatol Pract Concept*. 2013; 3: 11–14. doi: 10.5826/dpc.0304a03
2. Tan D, Kraybill W, Cheney RT, Khoury T. Retiform hemangioendothelioma: a case report and review of the literature. *J Cutan Pathol*. 2005; 32: 634–7. doi: 10.1111/j.0303-6987.2005.00379.x.
3. Requena L, Kutzner H. Hemangioendothelioma. *Semin Diagn Pathol*. 2013; 30: 29–44. doi: 10.1053/j.semdp.2012.01.003.